

Organizzazione UOC

**Ambulatorio di Colposcopia
Polo Ospedaliero di Treviglio**
Martedì e Venerdì ore 08.30 -13.30

**Ambulatorio di Colposcopia
Polo Ospedaliero di Romano**
Mercoledì ore 13.30 -15.45

Numeri Utili:

Amb. Treviglio: 0363/424388


Amb. Romano: 0363/990260

Per prenotazioni:

CUP: 0363/304241

Call Center Regionale: 800/638638

Intervento LEEP Cono cervicale



AMBULATORIO DI COLPOSCOPIA

UOC Ostetricia e Ginecologia
Ospedale di Treviglio – Ospedale di Romano
Dir. dr.ssa Antonella Villa

Sistema Socio Sanitario

 **Regione
Lombardia**
ASST Bergamo Ovest

Promemoria intervento LEEP

Conizzazione cervicale in anestesia locale.

Definizione: LEEP Loop Electrosurgical Excision Procedure

Traduzione: Biopsia escissionale con ansa diatermica

Conizzazione del collo uterino

Questo intervento si esegue in regime ambulatoriale, con adeguata anestesia locale, per la rimozione di una piccola lesione precancerosa del collo uterino mediante l'utilizzo di ansa diatermica di minime dimensioni, al fine di rimuovere la lesione intaccando il tessuto cervicale circostante nel minor modo possibile.

Si raccomanda al paziente di presentarsi in ambulatorio:

- Dopo aver assunto una leggera colazione
- Necessaria rimozione di anelli ed eventuali piercing
- La paziente dovrà essere accompagnata.

Anche se l'intervento, nella maggior parte dei casi, permette di rimuovere completamente la lesione, esiste una possibilità che quest'ultime possano permanere o ripresentarsi (tra il 5 – 15% dei casi). È importante, perciò, dopo l'intervento, sottoporsi a periodici controlli che consentano di evidenziare eventuali persistenze o la ricomparsa della patologia.

Le indicazioni relative al primo controllo le saranno comunicate al momento del ritiro dell'esame istologico della LEEP.

Al primo controllo sarà sottoposta ad un Pap Test e HPV Test.

Dopo non meno di 30 giorni dall'esecuzione del Pap Test e dall'HPV Test, la paziente dovrà prenotare presso il CUP una colposcopia di controllo.

Indicazioni post intervento LEEP

Gentile signora,

In data odierna è stata sottoposta ad un intervento che prevede l'asportazione di una lesione del collo dell'utero.

Generalmente nelle ore immediatamente dopo l'intervento e nei giorni successivi non si ha dolore; potrà, invece, avere una perdita di sangue o perdita giallastra per 7-15 giorni.

In alcuni casi la perdita di sangue potrebbe, invece, insorgere dopo 10 -15 giorni, anche in modo abbondante: non deve preoccuparsi poiché è da ritenersi, entro certi limiti, normale.

Per evitare sanguinamenti si consiglia di non praticare attività sportiva per 3 giorni, di astenersi dai rapporti sessuali e di evitare lavande vaginali interne e visite ginecologiche per un periodo di 3-4 settimane.

A volte l'intensità della perdita di sangue è nettamente superiore ad un flusso mestruale, simile ad un'emorragia (si verifica meno dell'1% dei casi): può essere necessario in questi casi rivolgersi al pronto soccorso più vicino (dove è possibile bloccare l'emorragia inserendo un tampone vaginale).

Il ciclo mestruale successivo all'intervento potrà essere più abbondante.