

# HPV VACCINAZIONE




L'infezione da Papilloma virus umano (HPV) è l'infezione sessualmente trasmessa più diffusa in entrambi i sessi.

L'HPV è stato individuato come una delle cause di neoplasia a carico di cervice uterina, vagina, vulva, ano, cavo orale (HPV ad alto rischio sono: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58), nonché responsabile dei condilomi (HPV a basso rischio 6, 11).

L'HPV causa Condilomi e Tumori che il vaccino può prevenire



## Cancri causati da HPV e percentuali



HPV di solito viene **eliminato spontaneamente** dall'organismo, nell'**80-90%** in un periodo variabile 4 e 20 mesi, si parla di **infezione transitoria**.

Alcuni tipi di HPV (alto rischio) possono **"persistere e/o progredire"** **infezione persistente** (20%) provocando, a distanza di anni (se non diagnosticati) lesioni preneoplastiche e tumori.

Il **vaccino** contro l'HPV viene somministrato per **via intramuscolare** nel braccio in 3 dosi:

- la prima dose al tempo 0
- la seconda dose dopo 2 mesi
- la terza dose dopo 6 mesi

## VACCINAZIONE HPV 9-valente

Il vaccino 9-valente protegge da **HPV 6-11-16-18-31-33-45-52-58**

L'ASST Bergamo Ovest offre il **vaccino 9-valente** in regime di **copagamento**, come da indicazioni di Regione Lombardia, alle ragazze/donne e ai ragazzi/uomini che non rientrano nella copertura gratuita del SSN.

*Il percorso vaccinale è garantito dalla collaborazione con le U.O. di Ostetricia-Ginecologia, Urodinamica, Citologia, e del referente CIO della ASST BG Ovest.*

### I rischi della vaccinazione

- Reazioni locali nel braccio dove il vaccino è stato inoculato. dolore, arrossamento o gonfiore
- Febbre
- Cefalea
- Stanchezza

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Bergamo Ovest