ETICHETTA PAZIENTE

☐	**Uomo adulto - Donna non gravida Bambino/a con peso superiore a 42Kg**	**Curva standard** dopo carico di 75 g di glucosio	Basale (tempo 0), Dopo 120 minuti
☐	**Bambino/a con peso fino a 42 Kg**	**Curva standard** dopo carico di 1,75 g/Kg di glucosio	Basale (tempo 0) Dopo 120 minuti
☐	**Donna gravida**	**Curva standard** dopo carico di 75 g di glucosio	Basale (tempo 0), Dopo 60 minuti Dopo 120 minuti
☐	**Uomo adulto - Donna (gravida e non) Bambino/a con peso superiore a 42 Kg**	**Curva** dopo carico di 75 g di glucosio **con tempi diversi**	Prelievi a tempi vari
☐	**Bambino/a con peso inferiore a 42 Kg**	**Curva** dopo carico di 1,75 g/Kg di glucosio **con tempi diversi**	Prelievi a tempi vari

VERIFICA PRE-TEST

Verifica correttezza dati anagrafici ed esami richiesti	[Sì]
Nei 3 giorni precedenti è stata seguita la dieta abituale (dieta libera contenente almeno 150 g di carboidrati al giorno) e mantenuta la consueta attività fisica	[Sì] [No]*
Il paziente è **digiuno da 8-14 ore**	[Sì] [No]*
Il paziente è affetto da malattie con stato febbrile in corso	[Sì]* [No]
Il paziente è diabetico	[Sì]* [No]
Il paziente assume farmaci ipoglicemizzanti (insulina, metformina, etc...)	[Sì]* [No]
Il paziente è intollerante o allergico agli eccipienti: arancia, acido citrico, para-idrossibenzoati, colorante E110	[Sì]* [No]
Il paziente è stato sottoposto a gastroresezione o gastroriduzione	[Sì]*[&] [No]

* in caso di risposta segnata con asterisco la curva da carico non può essere eseguita

[&] se, consultato il medico, si ritiene necessario, si procede con l'esame sotto stretto monitoraggio, dopo aver informato l'utente del possibile rischio di ipoglicemia e acquisito il consenso *(Firma dell'utente che ha compreso e accetta)*

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TEST

- Prima di iniziare, viene valutata la glicemia da sangue capillare tramite puntura del dito
- Se la **glicemia capillare** è **<126 mg/dL per la curva standard**, o **<92 mg/dL per la curva in gravidanza**, si procede con il test. Se è superiore o uguale, viene eseguito il prelievo venoso basale e si attende il risultato. Se la glicemia basale è ≥92 in gravidanza o ≥126 curva standard non si procede.
- Viene eseguito il prelievo basale e assunta la soluzione di glucosio (volume circa 300 mL) in circa 5 minuti
- Durante il test si deve rimanere seduti o sdraiati, senza fumare o mangiare; si può bere qualche sorso d'acqua, dopo almeno 15 minuti dall'assunzione del glucosio;
- L'assunzione di eventuali farmaci (non salvavita) deve essere rimandata fino all'avvenuta effettuazione dell'ultimo prelievo.

(Sigla del Prelevatore) *(Firma dell'utente)*

Valore glucosio POCT: _____ _____
(mg/dL) *(Sigla del Prelevatore)*

□ Inviato in Laboratorio per controllo ora ____:____ Valore comunicato dal Labor. _____ ora ___:___
(mg/dL)

Ora somministrazione glucosio: ____:____ _____
(Sigla del Prelevatore)

Orari a cui presentarsi per i prelievi successivi:

□ 30 minuti ora___:___ □ eseguito _____
(Sigla del prelevatore)

□ 60 minuti ora___:___ □ eseguito _____
(Sigla del prelevatore)

□ 90 minuti ora___:___ □ eseguito _____
(Sigla del prelevatore)

□ 120 minuti ora___:___ □ eseguito _____
(Sigla del prelevatore)

□ 150 minuti ora___:___ □ eseguito _____
(Sigla del prelevatore)

□ 180 minuti ora___:___ □ eseguito _____
(Sigla del prelevatore)

□ 240 minuti ora___:___ □ eseguito _____
(Sigla del prelevatore)

□ 300 minuti ora___:___ □ eseguito _____
(Sigla del prelevatore)

Eventuali note a cura del Prelevatore:_____

_____

_____

_____

Dopo l'uso il modulo è conservato presso il Centro Prelievi in apposito raccoglitore per almeno 1 anno