I Pazienti per i quali è richiesto **TUBO DIGERENTE** devono sottoporsi alla seguente preparazione all'esame:

1. Il giorno dell'esame: digiuno per cibi solidi e acqua dalla mezzanotte.
2. Si possono assumere eventuali terapie farmacologiche con poca acqua.
3. Astenersi dal fumo nelle ore precedenti l'esame.

Si raccomanda di portare eventuale documentazione precedente (esami radiologici e/o ecografici con i referti) relativa alla richiesta.

In caso di rinuncia si prega di avvisare tempestivamente chiamando il numero telefonico:

Call Center Regionale: da fisso 800.638.638 oppure **da cell. 02.99.95.99**

Treviglio: 0363.424203 **Romano di L.dia: 0363.990297**

ESAME RX APPARATO DIGERENTE (ESOFAGO - TUBO DIGERENTE PARZIALE O COMPLETO)

data__/__/___ Firma del paziente per ricevuta _____

Validata dal Direttore/Responsabile: data 16/4/24 firma

Dr. Andrea Alessandro Esposito
Direttore UOC Diagnostica per Immagini 1
C.F. SPSNRL74E21F205W
ASST Bergamo Ovest
Ospedale di Treviglio - Tel. 0363/4241

Validata dal Direttore/Responsabile: data 18/04/24 firma

Dr. Luca Emilio Voltini
C.F. VLT LML61H27A794F
UOC Diagnostica per Immagini 2
ASST Bergamo Ovest
Ospedale di Romano di L.dia - Tel 0363/9901

ASST Bergamo Ovest
SC Diagnostica per immagini 1 – Treviglio-Caravaggio
SC Diagnostica per immagini 2 – Romano di L.dia

Copia della presente informativa sottoscritta dal paziente deve essere allegata al consenso informato

Questa breve informativa ha lo scopo di facilitare la comprensione in merito al trattamento proposto e di rendere più agevole il colloquio clinico con il personale sanitario. Tale documento non potrà sicuramente essere esaustivo in tutti i particolari, per cui se si ritengono necessari ulteriori approfondimenti riguardo all'atto sanitario previsto, è opportuno porre tutti i quesiti del caso.
Il medico radiologo al momento dell'indagine spiegherà al paziente l'utilità e l'importanza diagnostica dell'esame; verificherà la possibilità di utilizzare esami alternativi che comportino meno rischi per il paziente e consentano ugualmente il raggiungimento della diagnosi secondo i principi di giustificazione e ottimizzazione previsti dalle leggi vigenti.
Dal momento che ogni atto medico richiede l'assenso dell'interessata/o dopo adeguata informazione, è importante leggere questo documento, a testimonianza del momento informativo intercorso, e, solo dopo averlo compreso, decidere di sottoscrivere coscientemente il consenso.
Si raccomanda di fornire la documentazione clinica, radiologica e strumentale relativa ad accertamenti diagnostici, esami di laboratorio o lettere di dimissioni precedenti.
Questa informativa sottoscritta, unitamente al consenso informato, è parte integrante della documentazione sanitaria.

***

Indicazione

Questo esame è indicato per lo studio dell'ipofaringe, dell'esofago, dello stomaco, del duodeno (tubo digerente parziale); in alcuni casi è richiesta la valutazione del transito intestinale (tubo digerente completo). Lo scopo dell'esame è quello di evidenziare alterazioni morfologiche e funzionali delle prime vie digestive.

Descrizione

L'esame consiste nella somministrazione per bocca di una sospensione baritata o di un mezzo di contrasto idrosolubile organo-iodato, a cui si associa generalmente l'assunzione di un granulato effervescente, che permette la distensione dei visceri da esaminare.
Durante l'esame il medico richiederà la sua collaborazione, in quanto dovrà assumere diverse posizioni per consentire la verniciatura delle pareti degli organi in esame.
In alcuni casi (tubo digerente completo) è richiesto un ulteriore accertamento radiologico a distanza di alcune ore dalla somministrazione del mezzo di contrasto, per la valutazione del transito intestinale.

Eventuali complicanze

L'indagine è di norma ben tollerata e non presenta rischi legati all'introduzione del solfato di bario diluito che, essendo inerte, non viene assorbito attraverso la mucosa. Molto raramente si verifica la comparsa di effetti secondari indesiderati. Non vi è alcuna prescrizione o precauzione da osservare dopo l'esame. La sospensione baritata ingerita, non essendo assorbita dall'intestino, viene eliminata normalmente nelle feci nei giorni successivi. Durante questo periodo, e comunque per almeno 3-4 giorni dopo l'indagine, non si possono eseguire altri esami radiografici e TC dell'addome, dell'apparato urinario, del rachide lombare e del bacino, per la sovrapposizione del contenuto radio-opaco intestinale.

Qualora si utilizzi un mezzo di contrasto organo-iodato (GASTROGRAFIN), occasionalmente (1 caso ogni 200.000 esami) possono insorgere effetti collaterali dovuti ad una eventuale allergia.

Reazioni avverse al mezzo di contrasto organo-iodato (GASTROGRAFIN)

Eventuali reazioni avverse (rare ed imprevedibili) sono legate ad un'intolleranza individuale alla sostanza somministrata.
Le reazioni avverse sono classificate come:
- lievi: nausea, vomito, prurito;
- moderate: vomito profuso, orticaria diffusa, edema facciale, broncospasmo;
- severe: shock ipotensivo, edema polmonare, arresto cardio-circolatorio.

Le prime si risolvono con semplici provvedimenti terapeutici. Le forme severe sono del tutto eccezionali. In questo Ospedale sono disponibili tutti gli strumenti per affrontarle in modo tempestivo. Le forme lievi e moderate possono presentarsi anche tardivamente (6-48 ore): in tale evenienza si consiglia di rivolgersi al proprio Medico curante o di contattare il servizio di Radiologia presso cui è stato eseguito l'esame.

Alternative al tubo digerente

L'alternativa al tubo digerente è rappresentata dall'endoscopia che ha una migliore sensibilità e specificità, ma risulta un esame più invasivo.

Poiché si tratta di un esame che espone a radiazioni ionizzanti se ne deve evitare l'utilizzo in assenza di un'indicazione clinica specifica. Le donne in età fertile devono escludere gravidanze in corso.

In caso di impossibilità a presentarsi all'appuntamento
prestabilito è invitato a comunicarlo quanto prima telefonando ai seguenti numeri:
Call Center Regionale: 800.638.638 oppure da cell. 02.99.95.99 -
Treviglio: 0363 424203 - Romano di Lombardia: 0363 990297