MODALITÀ ESECUTIVA

L'esame consiste nell'iniezione di 0,1 ml di soluzione di tubercolina nella cute dell'avambraccio, utilizzando un prodotto non registrato in Italia, ma autorizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

La lettura della reazione cutanea è eseguita dopo 48-72 ore.

Il test non è eseguito in caso di allergia nota ad uno dei componenti del prodotto utilizzato (PPD, Tween 80, fenolo, soluzione salina tamponata) o di reazione allergica in occasione di precedente test tubercolinico.

POSSIBILI COMPLICANZE / EVENTI AVVERSI

- prurito, eritema, dolore nel punto di iniezione: frequenti in caso di reattività al prodotto;
- comparsa di vescicola, ulcera, necrosi nel punto di iniezione: rari e solo in caso di reattività molto spiccata;
- rash cutaneo immediato o eruzione generalizzata nelle 24 ore successive: molto raro;
- ipersensibilità grave fino a reazione anafilattica / anafilattoide / shock: eccezionali.

ALTRE INFORMAZIONI

Dopo il test sono da osservare le seguenti norme precauzionali:

- rimanere nella sala di attesa almeno 30 minuti;
- non grattare, né applicare pomate, neanche in caso di prurito o comparsa di indurimento e/o arrossamento.

In caso di positività al test è raccomandato di rivolgersi al Medico Curante per valutare le eventuali ulteriori attività diagnostico-terapeutiche da svolgere.