**ATTENZIONE:**

Questo esame, in genere, viene eseguito tra la 35ª e la 37ª settimana di gravidanza per verificare lo stato di portatore del batterio.

## CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?

Chiedere al Centro Prelievi il contenitore per la raccolta, composto da una provetta con terreno liquido di trasporto dedicato e da un tampone floccato.

## COME FARE IL TAMPONE?

La paziente può eseguire in autonomia il tampone vagino-rettale, seguendo le indicazioni sotto indicate:

1. Aprire la bustina contenente il tampone floccato e la provetta;

   **Eseguire prima la raccolta vaginale**: inserire in vagina per 2-3 cm il tampone (bastoncino tipo cotton-fioc) e ruotarlo per raccogliere il liquido vaginale.

2. **Successivamente eseguire, con lo stesso tampone, la raccolta rettale**: introdurre nell'ano per circa 1 cm lo stesso tampone e ruotarlo per farlo sporcare di feci.

3. Svitare il tappo in maniera asettica e toglierlo dalla provetta;

4. Introdurre il tampone con il campione, appena raccolto, nella provetta e rompere l'applicatore nel punto indicato dalla linea colorata;

5. Riavvitare il tappo sulla provetta chiudendolo con forza;

6. Scrivere sull'etichetta della provetta cognome, nome, data e ora della raccolta.

7. Può conservare i campioni raccolti in frigorifero, fino a un massimo di 24 ore.

8. Consegnare i campioni entro 24 ore al Centro Prelievi/Laboratorio durante gli orari d'accettazione.