Gentile Signora, Egregio Signore,
le informazioni contenute in questo documento servono ad illustrarLe le modalità di esecuzione della preparazione al trattamento sanitario che Le è stato proposto.
***In caso di impossibilità a presentarsi all'appuntamento** prestabilito è invitato a comunicarlo quanto prima telefonando al n. 800638638 oppure dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 al n. 0363424600.*

1) RACCOMANDAZIONI

• **Pazienti in terapia anticoagulante:** consultare lo specialista di fiducia o il proprio curante per valutare eventuale sospensione o modifica della terapia (es. passaggio a terapia eparinica).
Se non controindicazioni cliniche, valgono le seguenti regole generali: per la terapia anticoagulante orale (TAO; es. Coumadin e Sintrom) sospensione 5 giorni prima dell'esame con eventuale passaggio a terapia eparinica; per i nuovi anticoagulanti orali (NAO; es. pradaxa, eliquis, lixiana, xarelto) sospendere 72 ore prima dell'esame; per sola eparina a basso peso molecolare (es. Clexane) sospensione almeno 12 ore prima dell'esame.
• **Pazienti in terapia antiaggregante singola:**
- acido acetilsalicilico (es. Cardioaspirin, Aspirinetta, Cardirene) può essere assunto prima della procedura.
- ticlopidina (Tiklid), clopidogrel (Plavix), prasugrel (Efient), ticagrerol (Brilique): la sospensione dell'antiaggregante 7 giorni prima, andrà valutata dal medico curante o dallo specialista che ha prescritto il farmaco.
• **Pazienti in doppia terapia antiaggregante:** consultare lo specialista di riferimento o il medico curante per verificare possibilità di sospensione, 7 giorni prima, almeno di uno dei due farmaci.

2) PREPARAZIONE ALLA PROCEDURA

Si raccomanda di seguire in modo corretto le indicazioni riportate in modo tale da favorire l'identificazione di lesioni evitando di dovere ripetere l'esame in tempi brevi.

1. SE LA RETTOSIGMOIDOSCOPIA È PRENOTATA DALLE ORE 8.00 ALLE 12.00

- Il giorno prima dell'esame: cena leggera; alle h 22.00 somministrare un clistere da 133 ml (Clisma-fleet) e trattenerlo per almeno 15 minuti.
- Il giorno dell'esame: almeno due ore prima dell'esame somministrare un clistere da 133 ml (Clisma-fleet) e trattenerlo per almeno 15 minuti digiuno fino al momento dell'esame.

2. SE LA RETTOSIGMOIDOSCOPIA È PRENOTATA DALLE ORE 12.00 ALLE 16.00

Il giorno dell'esame: colazione leggera poi digiuno fino al momento dell'esame
Almeno 4 ore prima della procedura somministrare un clistere da 133 ml (Clisma-fleet) e trattenerlo per almeno 15 minuti.
Almeno 2 ore prima dell'esame somministrare un clistere da 133 ml (Clisma-fleet) trattenerlo per almeno 15 minuti.