Esame	**Sede di esecuzione**	**Motivazione per non esecuzione in tutti gli altri Punti Prelievo**
Crioglobuline	Treviglio / Romano	Impossibilità di mantenere il campione a 37°C
Curve ormonali con o senza stimolazione	Treviglio / Romano	L'organizzazione non prevede un orario congruo di apertura del servizio
Glicemia con carico	Treviglio / Romano / Punto Prelievi di Dalmine	L'organizzazione non prevede un orario congruo di apertura del servizio ed impossibilità di valutare la glicemia basale prima di somministrare il carico.
Prolattina (curva dopo 30' o 60')	Treviglio / Romano	Organizzazione non adatta alla tipologia di prelievo
Emogas arterioso	Treviglio / Romano *	Impossibilità di conservare il campione in ghiaccio
Emogas venoso	Treviglio / Romano *	Impossibilità di conservare il campione in ghiaccio
Tampone cervicale	Treviglio	L'organizzazione non prevede personale addestrato alla tipologia di prelievo
Tampone vaginale	Treviglio	L'organizzazione non prevede personale addestrato alla tipologia di prelievo
Tampone uretrale (FEMMINILE)	Treviglio	L'organizzazione non prevede personale addestrato alla tipologia di prelievo
Tampone uretrale (MASCHILE)	Treviglio / Romano	Impossibilità di controllare la fase preanalitica del prelievo
Test alla tubercolina	Treviglio / Romano	L'organizzazione non prevede personale addestrato alla tipologia di prelievo e alla lettura del risultato (preferibile un medico)
Test al lattosio	Treviglio / Romano	L'organizzazione non prevede un orario congruo di apertura del servizio
Glicemia post-prandiale	Basale in tutti i Punti Prelievo, Per la post: Treviglio / Romano / Punto prelievi di Dalmine	L'organizzazione non prevede un orario congruo di apertura del servizio
Analisi successive al prelievo basale	Treviglio / Romano / Punto Prelievi di Dalmine	L'organizzazione non prevede un orario congruo di apertura del servizio

Esame	Sede di esecuzione	Motivazione per non esecuzione in tutti gli altri Punti Prelievo
Calcio ionizzato	Treviglio / Romano *	Impossibilità di conservare il campione in ghiaccio
Ricerca DNA-*Mycoplasma pneumoniae*	Treviglio / Romano	Impossibilità di conservare il campione per il tempo necessario al trasporto (tampone a secco)
Spermiogramma	Treviglio	Impossibilità di mantenere il campione a 37°C
Tempo di emorragia	Treviglio / Romano	L'organizzazione non prevede personale addestrato alla tipologia di prelievo
Ricerca Dermatofiti	Treviglio	L'organizzazione non prevede personale addestrato alla tipologia di prelievo
Quantiferon	Treviglio / Romano	Impossibilità di mantenere il campione a 37°C

*: Si accettano anche per pazienti **ricoverati** presso Case di Riposo e per pazienti domiciliari **non trasportabili.**
In tutti i casi **i campioni devono pervenire in laboratorio refrigerati ed entro 30 minuti dall'esecuzione del prelievo**.